

DESCRIPTION D'UN MELASIDAE NOUVEAU DE LA COLLECTION  
DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS,

PAR M. E. FLEUTIAUX,  
CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

**Xylophilus guyanensis** nov. sp.

Long. 4 millim. Oblong, convexe; noir brillant; pubescence obscure, peu apparente, plus longue sur les élytres. Tête convexe, ponctuée, faiblement carénée au milieu; bord antérieur interrompu sur la base de l'épistome; épistome rétréci en arrière, à peu près aussi large à la base que l'espace surantennaire; bord antérieur sinué. Antennes moniliformes (4 derniers articles manquent), noires; 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> articles ferrugineux, courts, subégaux, plus étroits que les autres, pronotum aussi long que large, arrondi sur les côtés, rétréci en avant, convexe; ponctuation moins serrée sur le dos; angles postérieurs faiblement carénés. Écusson enfoncé. Élytres subparallèles, arrondis au sommet, cylindriques; ponctuation espacée; stries légères. Dessous noir; ponctuation grosse sur le propectus. Propleures en trapèze allongé, limités latéralement par une fine carène. Reste du dessous brillant; ponctuation moins grosse et peu serrée. Épisternes métathoraciques faiblement élargis en arrière. Hanches postérieures rétrécies en dedans, plus larges en dehors que les épisternes; bord postérieur à peine sinué. Dernier arceau ventral en pointe obtuse. Pattes ferrugineuses; 4<sup>e</sup> article des tarses petit, obliquement tronqué; onychium aussi long que les deux précédents articles; griffes relativement fortes.

Guyane française : Saint-Jean-du-Maroni, mai (R. Benoist).

Forme plus courte et moins parallèle que *X. corticalis* Paykull. Entièrement noir, à peine ferrugineux à l'extrême base des élytres. Front légèrement caréné, non impressionné entre les antennes. Pronotum rétréci en avant. Écusson logé dans une fossette. Élytres un peu atténués en arrière. Dernier arceau ventral en pointe obtuse.

Nota. — Dans mon tableau de *Melasinæ* (*Ann. Soc. Ent. Belg.*, 1921, p. 222), le genre *Xylobius* est placé par erreur dans la division : 4<sup>e</sup> article des tarses évidé en dessus pour recevoir le suivant et plus

ou moins dilaté ou bilobé en dessous. C'est dans celle : 4<sup>e</sup> article des tarsi normal ou obliquement tronqué, mais non évidé en dessus, qu'il doit aller. Méquignon (*Ann. Soc. Ent. France*, 1922, pp. 369 et 372) a fort justement rétabli le nom de *Xylophilus* Mannerheim, 1823, qui prime celui de *Xylobius*, Latreille, 1834.